INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

 N^o de publication :

(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

No d'enregistrement national :

98 04543

2 777 181

(51) Int Cl⁶: **A 61 K 7/48**, A 61 K 9/107

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

Date de dépôt : 10.04.98.

Priorité:

(71) Demandeur(s): LVMH RECHERCHE Groupement d'intérêt économique — FR.

Date de mise à la disposition du public de la demande : 15.10.99 Bulletin 99/41.

Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : Se reporter à la fin du présent fascicule

Références à d'autres documents nationaux apparentés :

(72) Inventeur(s): MEYBECK ALAIN.

(73) Titulaire(s) :

(74) Mandataire(s): CABINET BEAU DE LOMENIE.

COMPOSITIONS COSMETIQUES OU DERMATOLOGIQUES SOUS FORME D'EMULSIONS DE TYPE EAU-DANS-HUILE RENFERMANT DES CYCLOMETHICONES ET DES PHOSPHOLIPIDES ET LEUR PROCEDE DE PREPARATION.


L'invention concerne des compositions cosmétiques ou dermatologiques pour application topique, sous forme d'émulsions eau-dans-huile.

Ces compositions contiennent, en poids:

1 à 50 %, de préférence 3 à 20 %, d'une cyclométhicone répondant à la formule générale:

- 1 à 50 %, de préférence 4 à 30 %, d'un phospholipide naturel ou d'un mélange de phospholipides naturels,

- 40 à 90 %, de préférence 60 à 90 %, d'eau. Elles présentent l'avantage de pouvoir être utilisées pour véhiculer des actifs ainsi bien hydrosolubles que liposolubles.



dans laquelle n est compris entre 3 et 6 et de préférence égal à 4 ou 5, ou d'un mélange de cyclométhicones, - 0, 5 à 30 %, de préférence 1 à 15 %, d'un hydrocarbure liquide en C_6 à C_{40} , d'un ester liquide d'acide gras et d'alcool gras ou d'un mélange de tels hydrocarbures et/ ou es-



La présente invention concerne de nouvelles compositions cosmétiques ou dermatologiques pour application topique, sous forme d'émulsions de type eau-dans-huile, renfermant des cyclométhicones et des phospholipides et leur procédé de préparation.

Les formulations cosmétiques sont, d'une façon générale, destinées à apporter à la peau des substances susceptibles d'améliorer son état ou de la protéger.

Ces substances sont, d'une façon générale, des substances hydratantes, protectrices, régulatrices, nutritives, etc. Elles sont de nature chimique très variée et peuvent être soit plutôt hydrosolubles, soit plutôt liposolubles.

On connaît tout l'intérêt des phospholipides, en particulier des phospholipides naturels tels que ceux que l'on trouve dans les lécithines, pour certains types de formulations cosmétiques telles que les dispersions de liposomes. On connaît, par ailleurs, des émulsions de triglycérides stabilisées par de la lécithine.

Tous ces produits laissent bien souvent sur la peau un toucher jugé trop gras lors d'applications dans le domaine de la cosmétique.

Les cyclométhicones sont des composées cycliques de type diméthylpolysiloxane répondant à la formule générale :

25

30

5

10

15

20

dans laquelle n présente une valeur moyenne comprise entre 3 et 6.

Les produits de la famille des cyclométhicones sont particulièrement connus dans le domaine de la cosmétique pour leur qualité de toucher cosmétique lors de l'application sur la peau. Toutefois, ces produits présentent l'inconvénient de ne pas former facilement des émulsions stables avec l'eau.

On a maintenant découvert que, de façon tout à fait inattendue, les produits de la famille des cyclométhicones, à condition d'être mélangés à un autre

produit hydrophobe choisi parmi les hydrocarbures liquides et les esters liquides d'acide gras et d'alcool gras, pouvaient conduire à des émulsions stables avec l'eau en présence de phospholipides naturels, en particulier de lécithines.

Les émulsions ainsi formées s'avèrent particulièrement stables et présentent d'excellentes qualités cosmétiques.

Un avantage supplémentaire de telles émulsions est qu'elles peuvent être utilisées pour véhiculer dans la peau des actifs cosmétiques ou dermatologiques aussi bien hydrosolubles que liposolubles.

Une des caractéristiques essentielles des compositions décrites dans ce document est qu'elles sont sous forme d'émulsions. C'est pourquoi on les désignera ci-après indifféremment par émulsions ou compositions.

Ainsi, selon un premier aspect, l'invention concerne une composition cosmétique ou dermatologique pour application topique sous forme d'émulsion de type eau-dans-huile, caractérisée en ce qu'eile contient, exprimé en pourcentage en poids :

- 1 à 50 %, de préférence 3 à 20 %, d'une cyclométhicone répondant à la formule générale :

- dans laquelle n est compris entre 3 et 6 et de préférence égal à 4 ou 5, ou d'un mélange de cyclométhicones,
 - 0,5 à 30 %, de préférence 1 à 15 %, d'un hydrocarbure liquide en C₆ à C₄₀, d'un ester liquide d'acide gras et d'alcool gras ou d'un mélange de tels hydrocarbures et/ou esters,
- 25 1 à 50 %, de préférence 4 à 30 %, d'un phospholipide naturel ou d'un mélange de phospholipides naturels,
 - 40 à 90 %, de préférence 60 à 90 %, d'eau.

Comme on l'a vu précédemment, les cyclométhicones sont des diméthylsiloxanes cycliques répondant à la formule générale :

30

5

10

15

dans laquelle n a une valeur moyenne comprise entre 3 et 6. Toutefois, pour la préparation des émulsions de l'invention, on choisira avantageusement les cyclométhicones dans lesquelles n présente une valeur moyenne de 4 ou 5.

5

10

15

20

25

30

L'hydrocarbure ou les hydrocarbures liquides utilisés éventuellement dans la préparation des émulsions définies ci-dessus pourra être tout hydrocarbure liquide en C₆ à C₄₀ ou tout mélange de tels hydrocarbures liquides On choisira avantageusement un hydrocarbure saturé qui pourra être linéaire dans le cas des hydrocarbures les plus légers, dès l'instant où cet hydrocarbure est liquide. Cet hydrocarbure pourra être également un hydrocarbure ramifié, ce qui est indispensable pour les hydrocarbures les plus lourds. A titre d'exemples d'hydrocarbures utilisables, on citera l'isododécane.

Par esters liquides d'acide gras et d'alcool gras, on entend, au sens de l'invention, des esters liquides présentant des chaînes d'acide et d'alcool contenant de 8 à 30 atomes de carbone.

Lorsque la composition de l'invention contiendra de tels esters liquides, ils seront avantageusement choisis parmi les esters liquides d'alcools gras et d'acides gras naturels. On choisira avantageusement l'huile de jojoba. On pourra toutefois également choisir l'huile de jojoba synthétique.

Comme phospholipide ou mélange de phospholipides, on pourra utiliser tout phospholipide naturel. On utilisera toutefois de préférence la lécithine de soja ou la lécithine d'oeuf.

j

On a remarqué que l'on améliorait encore la stabilité de l'émulsion lorsque les proportions de cyclométhicones et d'hydrocarbures et d'esters d'acides et d'alcools gras sont telles que les hydrocarbures et les esters d'acides et d'alcools gras représentent au moins 30 % en poids par rapport à la cyclométhicone ou au mélange de cyclométhicones.

La phase aqueuse de l'émulsion de l'invention contient avantageusement au moins un alcool en C_2 à C_6 ou un polyol en C_2 à C_6 ou encore un mélange de tels alcools et polyols. A titre d'alcools ou polyols préférés en C_2 à C_6 , on citera l'éthanol, le propanol, le propylèneglycol, le butylèneglycol, le

glycérol et le sorbitol. Ces alcools et/ou polyols et/ou mélanges d'alcools et de polyols, lorsqu'ils sont introduits dans les émulsions de l'invention représentent de préférence de 0,1 à 15 %, de préférence de 1 à 5 % en poids par rapport au poids total de l'émulsion.

L'émulsion peut contenir en outre de 0,1 à 10 % en poids d'un autre composé hydrophobe ou d'un mélange d'autres composés hydrophobes, lesdits autres composés hydrophobes étant choisis parmi les cires, les huiles végétales, les triglycérides d'acides gras et les stérols.

Enfin, les émulsions de l'invention pourront contenir différents adjuvants tant hydrophiles que lipophiles classiquement utilisés dans les compositions cosmétiques ou dermatologiques.

Ainsi, les émulsions de l'invention pourront contenir avantageusement :

- de 0,1 à 1 % en poids d'additifs choisis parmi les conservateurs, les bactéricides et les fongicides,
 - de 1 à 5 % en poids d'un filtre UV ou d'un mélanges de filtres UV,
 - de 0,1 à 5 % en poids de parfums,

5

10

20

25

30

35

- de 1 à 10 % en poids de particules solides choisies parmi les pigments, les micropigments et les charges minérales.

L'intérêt des émulsions de l'invention est essentiellement qu'elles peuvent être utilisées pour véhiculer dans la peau des substances aussi bien hydrophobes qu'hydrophiles.

Les substances hydrophiles ou hydrophobes visées peuvent être tout agent cosmétique ou dermatologique soluble dans l'eau, dans les hydrocarbures ou dans des huiles.

L'invention vise tout particulièrement des compositions cosmétiques ou dermatologiques sous forme d'émulsions telles que définies précédemment et contenant, en outre, 0,001 à 5 % en poids d'agents actifs cosmétiques ou dermatologiques choisis parmi les agents cosmétiques ou dermatologiques solubles dans l'eau, ou dans les hydrocarbures ou dans les huiles.

A titre d'exemples non limitatifs de substances actives cosmétiques ou dermatologiques, on citera tout particulièrement celles choisies dans le groupe constitué des vitamines et dérivés de vitamines, des oligo-éléments, des acides aminés, des céramides, des stérols, de l'acide rétinoïque, des ecdystéroides tels que la 20-hydroxyecdysone, de l'acide β-glycyrrhétinique, du glycyrrhizinate d'ammonium, de l'hydroquinone et de ses dérivés, de l'acide kojique, de l'urée, du

pyroglutamate de sodium, des triterpènes, des ginsenosides, des dérivés des acides asiatique et madécassique, du séricoside, de la visnadine, de la caféine, des monoet diméthylxanthines, des extraits végétaux, des extraits d'algues, des extraits de levures, des extraits de bactéries, des extraits de champignons, de la mélatonine, de la DHEA, des protéines, des alcools gras, des sucres, des α -hydroxyacides, des huiles essentielles, du panthénol, de l'acide salicylique.

Enfin, selon un deuxième aspect, l'invention concerne un procédé de préparation des compositions sous forme d'émulsions telles qu'elles ont été définies précédemment.

Selon ce procédé :

5

10

- on réalise un premier mélange comprenant le ou les phospholipides, les hydrocarbures et les esters liquides d'acides et d'alcools gras,
- on ajoute dans ledit mélange les différents adjuvants hydrophobes de la formulation,
- 15 on ajoute ensuite la cyclométhicone ou le mélange de cyclométhicones,
 - on disperse éventuellement les pigments dans le mélange, pour préparer une première phase dite phase hydrophobe A,
- on dissout, le cas échéant, les constituants hydrophiles de ladite 20 émulsion dans l'eau pour former une phase aqueuse, dite phase aqueuse B,
 - on ajoute la phase aqueuse B dans la phase hydrophobe A.

EXEMPLES

Les compositions cosmétiques dont la formulation est donnée dans les exemples ci-après dans lesquels les proportions des différents constituants sont exprimées en pourcentages en poids sont préparées en suivant le mode opératoire suivant :

30 Phase A:

35

- 1) On mélange en agitant ou en malaxant la lécithine avec les hydrocarbures ou les esters liquides d'acides gras et d'alcool gras.
- 2) On rajoute à ce mélange en agitant ou en malaxant les différents adjuvants hydrophobes de la formulation.
- 3) On ajoute à ce mélange en agitant, la quantité prévue de cyclométhicone.

4) Eventuellement on disperse les pigments dans ce mélange.

Phase B:

- 5) On dissout dans la quantité d'eau prévue les constituants hydrophiles de la formule (conservateurs, polyols, produits à activité cosmétique ou dermatologique).
 - 6) On ajoute, lentement, sous agitation, la phase aqueuse B dans la phase hydrophobe A réalisée en 3) ou en 4).

10 Exemple 1 : Produit pour peaux sèches

D	ل ــــ	ce.	A	
Р.	กว	CP.	Δ	•

1

	Isododécane	4,3
	Lécithine d'oeuf	4
	Vitamine F	0,4
15	Cyclométhicone $(n = 4)$	10,8
	Parfum	0,5

Phase B:

	Glycérol		2
20	Sorbitol		2
	Urée		0,5
	Pyroglutamate de sodium		0,5
	20-hydroxyecdysone		0,1
	Parahydroxybenzoates		0,5
25	Eau	qsp	100

Exemple 2: Produit pour peaux sensibles

Phase A:

	Isododécane	6
30	Lécithine de soja	12
	Acide bêta-glycyrrhétinique	0,2
	Cyclométhicone $(n = 4)$	12
	Parfum	0,4

35 Phase B:

Glycérol 3

	Phosphate de vitamine E		0,1	
	Extrait butylèneglycolique		2	
	de Phélodendron amureuse		2	
-	Parahydroxybenzoates		0,5	
5	Eau	qsp	100	
	Francis 2 : Cohera anticipilisaamant	~ ** *		J
	Exemple 3 : Crème antivieillissement Phase A :			
	Isododécane		6	
10	Lécithine de soja		20	
10	Vitamine F		0,5	
	Linoléate de tocophérol		0,5	
	Palmitate de vitamine A		0,5	
	Parfum		0,5	
15	Cyclométhicone (n = 4)		12	
1.5	Cyclomedicone (ii 4)			
	Phase B:			
	Glycérol		3	
	Asiaticoside		0,3	
20	Phosphate de vitamine C		0,5	
	Parahydroxybenzoates		0,5	
	Eau	qsp	100	
	Exemple 4 : Produit de dermatologie dépigmentant			
25	Phase A:			
	Isododécane		4,2	
	Lécithine de soja		6	
	Acide transrétinoïque		0,02	
	Cyclométhicone (n = 4)		9,8	
30				
	Phase B:			
	Glycérine		2	·
	Hydroquinone		5	
	Conservateurs p-hydroxybenzoates		0,5	
			100	

.

REVENDICATIONS

1. Composition cosmétique ou dermatologique pour application topique, sous forme d'émulsion de type eau-dans-huile, caractérisée en ce qu'elle comprend, exprimé en pourcentages en poids :

5

15

20

25

- 1 à 50 %, de préférence 3 à 20 %, d'une cyclométhicone répondant à la formule générale :

- dans laquelle n est compris entre 3 et 6 et de préférence égal à 4 ou 5, ou d'un mélange de cyclométhicones,
 - 0,5 à 30 %, de préférence 1 à 15 %, d'un hydrocarbure liquide en C₆ à C₄₀, d'un ester liquide d'acide gras et d'alcool gras ou d'un mélange de tels hydrocarbures et/ou esters,
 - 1 à 50 %, de préférence 4 à 30 %, d'un phospholipide naturel ou d'un mélange de phospholipides naturels,
 - 40 à 90 %, de préférence 60 à 90 %, d'eau.
 - 2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que le(ou les) phospholipide(s) naturel(s) est(sont) choisi(s) parmi les lécithines, de préférence la lécithine d'oeuf ou de soja.
 - 3. Composition selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que les hydrocarbures et les esters d'acide et d'alcool gras représentent au moins 30 % en poids par rapport à la cyclométhicone ou au mélange de cyclométhicones.
 - 4. Composition selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce qu'elle contient en outre 0,1 à 15 % en poids, de préférence 1 à 5 %, d'un alcool ou d'un polyol en C₂ à C₆ ou d'un mélange de tels alcools et/ou polyols, lesdits alcools ou polyols étant de préférence choisis parmi l'éthanol, le propanol, le propylèneglycol, le butylèneglycol, le glycérol, le sorbitol.
- 5. Composition selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce qu'elle contient en outre de 0,1 à 10 % en poids d'un autre composé hydrophobe ou d'un mélange d'autres composés hydrophobes, choisis parmi les cires, les huiles végétales, les triglycérides d'acide gras et les stérols.

- 6. Composition selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce qu'elle comprend en outre de 0,1 à 10 % d'additifs choisis parmi les conservateurs, les bactéricides et les fongicides.
- 7. Composition selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisée en ce qu'elle comprend en outre 1 à 5 % en poids d'un filtre UV ou d'un mélange de filtres UV.

5

10

15

20

25

30

- 8. Composition selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisée en ce qu'elle contient en outre 0,1 à 5 % en poids de parfums.
- 9. Composition selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisée en ce qu'elle contient en outre 1 à 10 % en poids de particules solides choisies parmi les pigments, les micropigments et les charges minérales.
 - 10. Composition selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisée en ce qu'elle contient en outre 0,001 à 5 % en poids d'agents actifs cosmétiques ou dermatologiques solubles dans la phase aqueuse ou la phase huile constituant ladite émulsion.
 - 11. Composition selon la revendication 10, caractérisée en ce que lesdits agents actifs sont choisis dans le groupe constitué des vitamines et dérivés de vitamines, des oligo-éléments, des acides aminés, des céramides, des stérols, de l'acide rétinoïque, des ecdystéroides tels que la 20-hydroxyecdysone, de l'acide β-glycyπhétinique, du glycyπhizinate d'ammonium, de l'hydroquinone et de ses dérivés, de l'acide kojique, de l'urée, du pyroglutamate de sodium, des triterpènes, des ginsenosides, des dérivés des acides asiatique et madécassique, du séricoside, de la visnadine, de la caféine, des mono- et diméthylxanthines, des extraits végétaux, des extraits d'algues, des extraits de levures, des extraits de bactéries, des extraits de champignons, de la mélatonine, de la DHEA, des protéines, des alcools gras, des sucres, des α-hydroxyacides, des huiles essentielles, du panthénol, de l'acide salicylique.

-)

- 12. Procédé de préparation d'une composition selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que :
- on réalise un premier mélange comprenant le ou les phospholipides, les hydrocarbures et les esters liquides d'acides et d'alcools gras,
- on ajoute dans ledit mélange les différents adjuvants hydrophobes de la formulation,
- on ajoute ensuite la cyclométhicone ou le mélange de 35 cyclométhicones,

- on disperse éventuellement les pigments dans le mélange, pour préparer une première phase dite phase hydrophobe A,

5

- on dissout, le cas échéant, les constituants hydrophiles de ladite émulsion dans l'eau pour former une phase aqueuse, dite phase aqueuse B,

- on ajoute la phase aqueuse B dans la phase hydrophobe A.

...

INSTITUT NATIONAL

RAPPORT DE RECHERCHE PRELIMINAIRE

établi sur la base des demières revendications déposées avant le commencement de la recherche N° d'enregistrement national

FA 556659 FR 9804543

de la PROPRIETE INDUSTRIELLE

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande		
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas d des parties pertinentes	de besoin,	examinée	
X	EP 0 608 989 A (THE PROCTER 3 août 1994 * revendications 1-14; exem		1-12	
X	EP 0 526 289 A (L'OREAL) 3 * revendications 18-21; exe		1-12	
X	us 5 310 556 A (P. ZIEGLER) * le document en entier *) 10 mai 1994	1-12	
X	BASE DE DONNÉES "CHEMICAL / (SERVEUR: STN): Abrégé 125 Colombus, OH, USA; & JP 08 (SHISEIDO CO., Ltd) 21 MAI XP002089933 * le document en entier *	: 95 549, 127 519 A	1-12	
X	EP 0 661 035 A (L'OREAL) 5 * revendications 1-20; exem		1-12	
E	US 5 738 859 A (R. POSNER) * le document en entier *	14 avril 1998	1	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CL.6)
A	US 5 690 918 A (T. JACKS E 25 novembre 1997 * revendication 1 *	T AL.)	1	AOIR
1				
	·			
				Superior
	Date	d'achèvement de la recherche 13 janvier 1999	G1	ikman, J-F
X:pa Y:pa au A:pa	CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES articulièrement pertinent à lui seul articulièrement pertinent en combination avec un itre document de la même catégorie artinent à l'encontre d'au moins une revendication a artière-plan technologique général	T : théorie ou prin E : document de la à la date de dé de dépôt ou qu D : cité dans la de L : cité pour d'auti	prevet bënëficiant ppôt et qui n'a été r'à une date poste mande res raisons	d'une date antérieure